

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 12-11-71 234141

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 134 - NOVEMBRE 71

LA LUTTE AUTOMNALE CONTRE LES TAVELURES

---:---:---:---:---:---:---

Dans les vergers fortement contaminés par la Tavelure en cours de saison, il peut être intéressant de réduire les projections d'ascospores qui sont à l'origine des contaminations ^{au} printemps, soit en inhibant la formation des périthèces, donc des ascospores, soit en stérilisant ces périthèces, empêchant ainsi la projection des ascospores formées. En effet, la lutte contre les tavelures est d'autant plus facile au printemps que les ascospores sont peu nombreuses.

La formation des périthèces est inhibée par l'enfouissement des feuilles tombées à l'automne ou par une pulvérisation de sulfate d'ammoniaque à 12 % effectuée immédiatement après la chute des feuilles. Les colorants nitrés pulvérisés à la fin de l'hiver sur les feuilles restées à terre stérilisent les périthèces formés au cours de l'hiver et empêchent ainsi la projection des ascospores.

Des essais réalisés par l'Institut National de la Recherche Agromique, ainsi que des observations effectuées par le Service de la Protection des Végétaux semblent montrer qu'une pulvérisation effectuée entre la récolte des fruits et la chute des feuilles avec un produit à base de Bénomyl (100 g de M.A./hl) ou de Thiabendazole (200 g de M.A./hl) ou de Triprimol (15 g de M.A./hl) réduisait, dans une forte proportion, allant parfois jusqu'à 99 %, les projections d'ascospores.

S'il est prématuré d'affirmer que ces techniques peuvent réduire le nombre des traitements, il est par contre logique de penser qu'elles peuvent amener une diminution des risques de contamination et, par suite, faciliter la lutte contre les Tavelures. Toutefois, il est nécessaire de préciser que ces méthodes ne peuvent atteindre leur pleine efficacité que dans les vergers suffisamment isolés pour être à l'abri de tout apport d'ascospores venant de l'extérieur.

---:---:---:---:---:---:---

ABONNEMENTS 1972

l'année 1972 :

Tarifs :

Nous demandons à nos lecteurs de se réabonner sans attendre pour

25 F

Abonnement ordinaire (toutes publications)

25 F + 10 F

par série supplémentaire de bulletins envoyée à la même adresse

25 F + 20 F

par série supplémentaire de bulletins expédiée à une adresse différente

Le versement sera de préférence effectué à :

REGISSEUR DE RECETTES - D.D.A. de l'HERAULT

C.C.P. 5238.57 MONTPELLIER

Eventuellement rédiger votre chèque bancaire pour : REGISSEUR DE RECETTES DE LA D.D.A. DE L'HERAULT

Les abonnements contractés depuis le 1/7/1971 sont valables jusqu'au 31/12/1972.

7485

Tirage du 9 novembre 1971 - 2800 exemplaires - Précédent bulletin N° 133-3° supplément 22/10/71